

1	Wstęp	1
2	Pacjent nie wykazuje postępów lub nie współpracuje w dążeniu do celu terapii	5
2.1	Dążenia pacjenta są niejasne	5
2.2	Pacjent nie nawiązał kontaktu emocjonalnego z samym sobą i z terapeutą	9
2.3	Pacjent przyjmuje unikającą postawę	14
2.4	Pacjent twierdzi, że „nic mu nie pomaga”	19
2.5	Gwałtownie zmieniający się nastrój i zachowanie pacjenta oraz kontakt z nim	23
2.6	Pacjent bardzo narzeka	28
2.7	Pacjent trzyma się kurczowo terapeuty zamiast się usamodzielniać	31
2.8	Pacjent nie ma poczucia obowiązku w stosunku do terapii	35
2.9	Pacjent nie stosuje się do zasad obowiązujących w terapii	39
3	Trudne interakcje z innymi pacjentami lub personelem	43
3.1	Pacjent podejmuje jednocześnie kilka terapii	43
3.2	Pacjent narzeka na innych terapeutów	45
3.3	Pacjent narzeka na innych pacjentów	48
3.4	Dwoje pacjentów nawiązuje relację seksualną	52
4	Pacjent doszukuje się problemów głównie u innych, rzadko u siebie samego	55
4.1	Pacjent utrzymuje, że stał się ofiarą mobbingu	55
4.2	Pacjent narzeka przede wszystkim na partnera albo członków swojej rodziny	59
4.3	Pacjent umniejsza kompetencje terapeuty	61
4.4	Pacjent zachowuje się w sposób niekorzystny, nie postrzega jednak swojego zachowania jako problematyczne	65
5	Pacjent nie ujawnia ważnych informacji	71
5.1	Pacjent podaje nieprawdziwe informacje	71
5.2	Pacjentka przemilcza problemy ze wstydu	76
6	Klinika zastępuje pacjentowi jego naturalne otoczenie	79
6.1	Pacjent jest hospitalizowany	79
6.2	„Zysk z choroby” jest wysoki	81
7	Skłonności samobójcze	85
7.1	Kwestię skłonności samobójczych trzeba wyjaśnić	85
7.2	Pacjent ma skłonności samobójcze i jest skłonny do pertraktacji	88
7.3	Pacjent ma skłonności samobójcze i nie jest skłonny do pertraktacji	92
7.4	Pacjent przekazuje treści samobójcze	94
7.5	Pacjent popełnił samobójstwo (na terenie kliniki)	95
8	Pacjent odmawia stosowania się do procedur leczniczych	97
8.1	Pacjent nie chce przyjmować leków	97
8.2	Pacjent odmawia koniecznego przyjęcia na leczenie stacjonarne	99
8.3	Pacjent nie chce zostać wypisany ze szpitala	101

9	Leczenie jest utrudnione przez ograniczone zasoby pacjenta	103
9.1	Pacjent żyje w trudnym środowisku	103
9.2	Pacjent ma niewielkie kompetencje	105
9.3	Pacjentowi brakuje pewności siebie	107
9.4	Ofiara przemocy jest zbyt nieufna, by nawiązać relację terapeutyczną	110
9.5	Pacjentka cierpi na ciężkie dysocjacje	113
10	Często spotykane trudne sytuacje w kontakcie bezpośrednim	117
10.1	Pacjent płacze podczas rozmowy	117
10.2	Pacjent mówi niemal nieprzerwanie	120
10.3	Terapeuta jest znacznie bardziej aktywny niż pacjent	123
10.4	Pacjent irytuje terapeutę	127
10.5	Pacjent zadaje terapeutcie niedyskretne pytania	131
10.6	Pacjent jest zainteresowany terapeutką na tle erotycznym	133
10.7	Pacjent i terapeuta bardzo się różnią	135
	Skorowidz	139