

Wstęp	3
Charakterystyka województwa jako jednostki administracyjnej	4
Człowiek i jego działalność gospodarcza	16
Historia roślinności holoceniowej	26
Ogólna charakterystyka flory i szaty roślinnej	29
Metodyka badań	33
Przegląd zbiorowisk leśnych	34
<i>Carici elongatae-Alnetum</i> (Koch 1926) Tx. et Bodeux 1955 — łoś	35
<i>Carici remotae-Fraxinetum</i> Koch 1926 — podgórski łoś jesionowy	38
<i>Fraxino-Alnetum</i> Mat. 1952 — łoś olszowo-jesionowy	40
<i>Fraxino-Ulmetum</i> (R. Tx. ap. Lohm. 1932) Oberd. 1953 — łoś jesionowo-wiązowy	42
<i>Quercu-Carpinetum medioeuropaeum</i> Tx. 1936 — las dębowo-grabowy	44
Stanowiska systematyczne grądów Opolszczyzny	56
<i>Melico-Fagetum</i> Knapp 1942 — buczyna pomorska	57
<i>Dentario enneaphyllidis-Fagetum</i> (Preis 1938) Oberd. 1957 — żyzna buczyna górska	58
<i>Luzulo-Fagetum</i> (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 emend. Meusel 1937 — kwaśna buczyna górska	60
<i>Carpino-Prunetum spinosae</i> R. Tx. (1928) 1952 — zarośla tarniny	61
<i>Luzulo albidae-Quercetum</i> (Hilitzer 1932) Passarge 1953 emend. Neuhäusl et Neuhäuslova 1937 — acydofilny las dębowy	62
<i>Molinio arundinaceae-Quercetum</i> Neuhäusl et Neuhäuslova 1967 — ubogi las dębowo-brzozowy	65
Zbiorowisko z podwiązku <i>Vaccinio-Abietion</i> Oberd. 1962 — bór świerkowy w reglu dolnym	67
Zespoły związku <i>Dicrano-Pinion</i> Libb. 1933 — bory sosnowe	68
<i>Peucedano-Pinetum</i> Mat. 1962 — subkontynentalny bór sosnowy	69
<i>Leucobryo-Pinetum</i> Mat. 1962 — subatlantycki bór sosnowy	70
Podgórska odmiana zespołu <i>Leucobryo-Pinetum</i> Mat. 1962	71
Niżowa odmiana zespołu <i>Leucobryo-Pinetum</i> Mat. 1962	72
<i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> Kleist 1929 — bór bagienny	76
Bór mieszany zbliżony do <i>Pino-Quercetum</i> Kozł. 1925	77
<i>Salicetum triandro-viminalis</i> (Tx. 1931) Lohm. 1952 — nadrzeczne zarośla wierzbowe	79
<i>Salicetum albo-fragilis</i> Tx. (1948) 1955 — łoś wierzbowo-topolowy	80
Wyniki badań	81
Piśmiennictwo	85
Summary	87
Tablice fytosocjologiczne 1-25 — po s. 92	